

Гепатопротективная активность ремаксолола при хронических поражениях печени

(материалы многоцентрового рандомизированного плацебо-контролируемого исследования)

Сологуб Т.В., Горячева Л.Г., Суханов Д.С., Романцов М.Г., Антонова Т.В., Яковлев А.А., Радченко В.Г., А.А. Шульдяков, Речник В.Н., Суздальцев А.А., Есауленко Е.В., Максимов С.Л., Баранова И.П.

*Санкт-Петербургская государственная медицинская академия
им. И.И. Мечникова*

*Саратовский государственный медицинский университет
Самарский государственный медицинский институт
НИИ гриппа РАМН*

*Московский государственный медико-стоматологический университет
Санкт-петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И.П. Павлова*

*Городская инфекционная больница №30 им. С.П. Боткина
Пензенский государственный институт усовершенствования врачей*

Сведения об авторах:

Сологуб Тамара Васильевна – доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им. И.И. Мечникова. 195067, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., 47. тел. раб. (812)7122707, тел. моб. 89633221964. e-mail: Tomarasologub@rambler.ru.

Горячева Лариса Георгиевна – доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник, руководитель отдела вирусных гепатитов НИИ детских инфекций ФМБА;

Санкт-Петербург, 198022, ул. Профессора Попова д.9, тел.812-234-34-16

Суханов Дмитрий Сергеевич – кандидат медицинских наук, ассистент кафедры фтизиопульмонологии Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им. И.И. Мечникова. 195067, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., 47.

Романцов Михаил Григорьевич – доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им. И.И. Мечникова. 195067, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., 47.

Антонова Тамара Васильевна – доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Санкт-Петербургского

государственного медицинского университета им. И.П.Павлова.
197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д.6/8.

Яковлев Александр Авенирович – доктор медицинских наук, профессор,
главный врач городской инфекционной больницы №30 им. С.П. Боткина.
191167, г. Санкт-Петербург, ул. Миргородская, д. 3.

Радченко Валерий Григорьевич – доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой внутренних болезней медико-профилактического
факультета болезней Санкт-Петербургской государственной медицинской
академии им. И.И. Мечникова. 195067, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., 47.

Шульдяков Александр Анатольевич – доктор медицинских наук,
профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней Саратовского
государственного медицинского университета. 410012, г.Саратов, ул. Большая
казачья, 112.

Речник Валерия Николаевна – аспирант кафедры инфекционных болезней
Саратовского государственного медицинского университета. 410012,
г.Саратов, ул. Большая казачья, 112.

Суздальцев Алексей Александрович – доктор медицинских наук,
профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней Самарского
государственного медицинского института. 443099, г.Самара, ул. Чапаевская,
д. 227.

Есауленко Елена Владимировна – доктор медицинских наук,
руководитель отделения хронических вирусных гепатитов НИИ гриппа РАМН.
196376, Санкт-Петербург, ул. проф. Попова 15/17.

Максимов Семен Леонидович – кандидат медицинских наук, доцент
кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского
государственного медико-стоматологического университета. 127473, Москва,
ул. Делегатская, д. 20/1

Баранова Ирина Петровна – , доктор медицинских наук, профессор,
заведующая кафедрой инфекционных болезней Пензенского государственного
института усовершенствования врачей. г.Пенза, ул.Стасова д.8,

Введение. Сегодня одной из важнейших медико-социальных проблем в современном мире являются вирусные гепатиты. По данным ВОЗ, более трети населения земли уже инфицировано вирусами гепатита В, С и страдает различными формами этого заболевания. Именно с ними связано большинство летальных исходов у больных острыми гепатитами, а также все случаи развития хронических заболеваний печени, включая циррозы и первичный рак печени [3, 7,10].

При хронических поражениях печени развивается тканевая гипоксия, приводящая к нарушению функций митохондрий, истощаются запасы АТФ, в результате чего образуются свободные радикалы и активизируется перекисное окисление липидов (ПОЛ). При этом повреждаются клеточные мембраны (цитоплазматическая, митохондриальная) [6,7,9].

Антигипоксанты/антиоксиданты являются отдельной группой препаратов - «энергообеспечивающие средства – антигипоксанты», куда относятся и сукцинатсодержащие препараты, разработанные на основе янтарной кислоты и/или ее солей. Их активным компонентом являются янтарная кислота, при этом мощность системы энергопродукции, использующей сукцинат, в сотни раз, превосходит другие системы энергообразования организма [2,4,5].

К таким препаратам вполне может быть отнесен препарат «ремаксол»¹, содержащий в своем составе активные компоненты - янтарную кислоту, рибоксин, никотинамид, метионин, а также электролиты - натрия хлорид, магния хлорид, калия хлорид и сольстабилизирующий агент N-метилглюкамин. Активность компонентов, входящих в представляемую композицию, доказана в экспериментальных и клинических исследованиях. Метаболическую композицию «ремаксол», обладающую антиоксидантным/антигипоксантным действием следует рассматривать как перспективный

¹ Разработчиком и производителем препарата является ООО «НТФФ «ПОЛИСАН», Санкт-Петербург; Россия тел.812-110-82-25.

метаболический корректор с гепатопротективной активностью, который может быть использован у больных с хроническим поражением печени.

Материал и методы. Обследовано 494 больных хроническим гепатитом В и С различной степени активности². Больные рандомизированы, с использованием метода «конвертов» разделены на 2 группы (1-я основная группа, получавшая ремаксол - 294 чел. и 2 контрольная группа, получавшая «активное плацебо» (изотонический раствор хлорида натрия) - 200 чел.). В группах преобладали мужчины – 82,3 и 76,5% в основной и контрольной, соответственно, в возрасте от 18 до 65 лет. Преобладающим диагнозом хронический гепатит С (77,9 и 82% в основной и контрольной группах соответственно), наиболее часто встречался генотип 3а (55,8 и 42,1% в основной и контрольной группах). Одним из основных критериев включения больного в участие в исследование явилось повышение уровня АлАТ более 1,5 максимальных норм, а также добровольное подписание информированного согласия.

Оценка активности патологического процесса в печени пациентов до начала терапии показала, что у большинства регистрировалась умеренно выраженная активность с уровнем aminотрансфераз от 4 до 8 норм (соответственно 42,5% и 44,5%) и низкая активность (39,4% и 38,5% - АлАТ не превышали 120ед/л). Препарат вводился внутривенно, ежедневно в течение 12 дней по 400 мл, назначался на фоне базисной, максимально унифицированной терапии (поливитамины, спазмолитики, ферменты). Эффективность терапии оценивалась по динамике клинической картины хронического гепатита и лабораторным данным (активность aminотрансфераз, лактадегидрогеназы, гамма-глутамилтранспептидазы, щелочной фосфатазы; уровень мочевой кислоты, холестерина и глюкозы крови), которые определялись исходно, на протяжении терапии и по ее окончании.

² Разрешение на проведение клинических исследований получено от Росздравнадзора (Решение №47 от 06.02.2007).

Статистическая обработка, полученных данных осуществлялась с помощью пакета прикладных программ Microsoft Excel 2000, StatSoft Statistica v 6.0 с использованием параметрических и непараметрических методов вариационной статистики независимым специалистом, не принимающим участия в исследовании. Им же подготовлен проект заключительного отчета, который был согласован со всеми специалистами, участвующими в проведении исследования.

Результаты и их обсуждение.

Наиболее частыми жалобами больных были жалобы на слабость, быструю утомляемость («хроническую усталость»), тяжесть, боли в правом подреберье и снижение аппетита. Повышенная потливость, суставные и мышечные боли встречались реже, главным образом, у больных с высокой активностью и внепеченочными проявлениями болезни.

При клиническом осмотре пациентов регистрировался астеновегетативный (58,4% и 47,8%) и диспептический (43,7% и 45,5%) синдромы, но наиболее частым симптомом болезни была гепатомегалия (88,8% и 82,5%). Желтуха (иктеричность кожи и/или склер) выявлялась лишь у каждого 7-8 пациента, спленомегалия и геморрагический синдром – еще реже (табл.1). При назначении дезинтоксикационной терапии в обеих группах регистрировалось уменьшение жалоб и частоты патологических симптомов. Причем, у больных, леченных ремаксолом, существенно реже выявлялась слабость, тошнота, тяжесть в правом подреберье и болезненность живота при пальпации, соответственно астеновегетативный и диспептический синдромы выявлялись в 1,8-2 раза реже, чем у больных, получавших плацебо (табл.1).

Таблица 1

Частота клинических симптомов (в %) больных хроническим гепатитом В и С

Клинические синдромы	Больные, получавшие ремаксол		Больные, получавшие плацебо+базовую терапию		Р 3-5
	До лечения n = 294	По окончании лечения n = 293	До лечения n = 200	По окончании лечения n = 197	
1	2	3	4	5	6
Астено-вегетативный	58,4±2,8	8,8±1,7*	47,5±3,6	15,3±2,5*	<0,05
Диспептический	43,7±2,9	7,8±1,6*	45,5±3,5	13,7±2,4*	<0,05
Геморрагический	2,4±0,9	0,8±0,5	1,5±0,9	0,5±0,5*	
Желтуха	12,5±1,9	3,3±1,1*	13,5±2,4	7,4±1,9*	
Гепатомегалия	88,8±1,8	75,2±2,7*	84,0±2,5	80,4±2,8	
Спленомегалия	7,3±1,5	4,1±1,2	8,5±2,0	5,8±1,4	
Катаральный	0	0	0	1,0±0,7	

* - (p<0,05) от показателя до лечения.

Гипербилирубинемия у наблюдаемых больных исходно определялась в 24,7% и 18,3% случаев, при этом показатели общего билирубина у пациентов 1 группы до лечения были существенно выше, чем у пациентов 2 группы, получавших плацебо+базовую терапию (табл.2). После завершения терапии показатели общего и прямого билирубина у пациентов 1-й группы были существенно ниже исходных, тогда как у больных 2-й группы

достоверного снижения показателей не получено. Нарушение соотношения фракций билирубина при нормальных показателях общего билирубина уже косвенно указывает на признаки компенсированного холестаза. До начала терапии, у пациентов отмечалось повышение обеих фракций билирубина (табл.2), но в большей мере – прямого ($14,1 \pm 1,8$ и $13,4 \pm 2,1$).

Таблица 2

Динамика показателей билирубина у больных хроническим гепатитом В и С

№№ пп	Препарат	N	Общий билирубин (мкмоль/л)		Прямой билирубин (мкмоль/л)	
			До лечения	По окончании лечения	До лечения	По окончании. Лечения
1	Ремаксол	293	$36,6 \pm 3,2$	$22,1 \pm 1,7^*$	$14,1 \pm 1,8$	$9,2 \pm 0,5^*$
2	Плацебо	197	$25,3 \pm 2,6$	$19,7 \pm 1,6$	$13,4 \pm 2,1$	$10,0 \pm 0,6$
3	P 1-2		<0,05			>0,05
4	Норма		8,5-20,5		0-5,1	

* - ($p < 0,05$) между показателями до и после лечения.

Частота выявления общей и прямой гипербилирубинемии у больных, получавших ремаксол, снижалась в 2 и 1,6 раза. В то время как у пациентов, получавших плацебо+базовую терапию, отмечалась лишь тенденция к снижению показателей билирубина и его фракций. Уровень прямого билирубина после окончания лечения у больных 2 группы, также как и у пациентов 1 группы, в 2 раза превышал физиологическую норму, при этом отсутствовала и динамика частоты регистрации гипербилирубинемии (34,6% и 33,5%).

Оценка гепатопротекторного действия препарата, прежде всего, проводится по динамике показателей аминотрансфераз. Как было показано ранее, больные, получавшие ремаксол, имели более высокую активность воспалительного процесса, и исходные средние показатели ферментов АлАТ и АсАТ, соответственно, были выше, чем у больных, получавших плацебо на фоне базовой терапии (табл.3). Анализ полученных результатов, после завершения курса терапии, выявил существенное снижение уровня АлАТ у пациентов основной группы, в сравнении с больными контрольной (145,9±6,0, против 170,8±9,2 ед/л, соответственно).

Таблица 3.

Динамика показателей АлАТ, АсАТ, ЛДГ у больных хроническим гепатитом В и С

Показатели	Больные, получавшие ремаксол		Больные, получавшие плацебо+базовую терапию		Р
	До лечения n = 294	13 день терапии n = 293	До лечения n = 200	13 день терапии n = 197	
1	4	6	7	9	10
АлАТ (ед./л), норма до 42.0	280,9 ±20,4	145,9 ±6,0*	223,9 ±12,6	170,8 ±9,2*	Р 4-7, 6-9 <0,05
АсАТ (ед./л)	186,2 ±15,0	104,2 ±5,3*	134,1 ±8,9	106,9 ±8,9	Р 4-7 <0,05

Норма дл 40.0					
АсАТ/Ал	0,65	0,80	0,63	0,72	
АТ	±0,02	±0,03	±0,02	±0,04	
ЛДГ, норма до 460 МЕ (37°)	581,1 ±9,3	390,5 ±11,5*	507,5 ±13,3	549,2 ±16,5	P 4-7, 6-9 <0,05

* - (p<0,05) от показателя до лечения

Выраженный гепатотропный эффект препарата подтверждался частотой нормализации АлАТ и АсАТ и кратностью их снижения. Так, частота нормализации уровня АлАТ и АсАТ к 13-му дню терапии у пациентов, получавших ремаксол, составила соответственно $16,7 \pm 2,2$ и $21,5 \pm 2,4$ ед/л, в то время как у больных контрольной группы, получавших плацебо на фоне базовой терапии – $9,1 \pm 2,0$ и $14,7 \pm 2,5$ ед/л (p<0,05). Кратность снижения этих ферментов у больных основной группы составила 2,13 и 2,16 раза против 1,31 и 1,58 у пациентов контрольной группы. Более показательным критерием в оценке эффективности препарата была динамика фермента ЛДГ, характеризующего степень выраженности окислительно-восстановительных процессов и гликолиза. У больных основной группы снижение (в 1,5 раза) уровня ЛДГ свидетельствовало о переходе анаэробных процессов в аэробные, улучшая энергетическое обеспечение гепатоцитов. У пациентов контрольной группы (плацебо+базовая терапия) показатель несколько вырос, указывая на сохранность гипоксического состояния печени (табл.3).

Кроме прямой гипербилирубинемии, показателями холестаза являются ферменты гамма-глутамилтранспептидаза (γ -ГГТП) и щелочная фосфатаза (ЩФ), причем, γ -ГГТП в 1,5-2 раза чувствительнее. Так же, как и прямой билирубин, γ -ГГТП указывает на угрозу

развития холестаза, еще в стадии компенсации, является ферментом, ответственным за окислительно-восстановительные процессы в печени. У 71,1% больных обеих групп отмечались повышенные значения γ -ГГТП, средние показатели превышали норму в 3,7-4,1 раза, составляя 178,2-197,9 МЕ (табл. 4). После проведения инфузионной терапии у трети больных и в 1-ой, и во 2-ой группах снижалась частота регистрации гиперферментемии за счет γ -ГГТП (до 48,0-47,1%), но средние показатели у больных основной группы, получавших ремаксол, оказались существенно ниже, чем у пациентов контрольной (102,5, против 132,4 МЕ, $p < 0,05$) (табл.4). Эффективность препарата подтверждала и кратность снижения уровня фермента, составив 1,7 и 1,2, соответственно.

Таблица 4

Динамика показателей холестаза (γ -ГГТП, щелочной фосфатазы, холестерина) у больных хроническим гепатитом В и С

Препарат	γ -ГГТП		Щелочная фосфатаза		Холестерин	
	До лечения	13 день терапии	До лечения	13 день терапии	До лечения	13 день терапии
Ремаксол (n=293)	178,2 $\pm 13,9$	102,5 $\pm 6,1^*$	138,2 $\pm 5,2$	102,1 $\pm 3,9^*$	5,0 $\pm 0,2$	4,9 $\pm 0,1$
Плацебо +базовая терапия (n=197)	197,9 $\pm 19,2$	132,4 $\pm 8,2^*$	139,7 $\pm 7,4$	111,2 $\pm 4,4^*$	4,3 $\pm 0,1$	4,4 $\pm 0,1$
P 1-2		<0,05				
Норма	До 48 МЕ (37°)		До 120 МЕ/л		Менее 5,2 ммоль/л	

* - $p < 0,05$ от показателя до лечения.

ЩФ – дефосфорилирует белки, снижая активность регуляторных ферментов. Её средние уровни были незначительно выше, чем у здоровых лиц (табл. 4), а частота гиперферментемии составляла 33,5-33,3%. ЩФ оказалась менее «пластичным» критерием, в сравнении с АлАТ, АсАТ, γ -ГТП. Существенной разницы в её показателях после терапии у пациентов наблюдаемых групп не выявлено, но при лечении ремаксолом отмечено снижение уровня ЩФ, в сравнении с исходными данными (табл.4), а соответственно и кратность снижения фермента была выше, чем у больных, получавших плацебо (1,4, против 1,2, $p < 0,05$). Поражение печени при вирусных гепатитах, как правило, носит смешанный (комбинированный) характер – гепатоцеллюлярный/холестатический, что подтверждается коэффициентом АлАТ/ЩФ равным $2,0 < R < 5,0$, до начала терапии он составлял $2,7 \pm 0,18$ и $2,1 \pm 0,13$, соответственно в обеих группах.

Холестерин – значимый показатель липидного обмена и, в меньшей степени, холестаза. У наблюдаемых больных его уровень не превышал нормальных значений, а гиперхолестеринемия регистрировалась лишь в 14,4% и 7,6% случаев, т.е. чаще у больных основной группы (табл.4). После проведения курса ремаксолола установлена отчетливая тенденция к снижению частоты гиперхолестеринемии до 9,7%, тогда как плацебо+базовая терапия не оказывали никакого влияния. Под воздействием ремаксолола у ряда больных происходило улучшение окислительно-восстановительных процессов, приводящее к быстрому окислению холестерина в желчные кислоты, обеспечивая уменьшение холестаза.

Проявление цитолитического синдрома (катаболизм нуклеиновых кислот за счет распада ядер гепатоцитов) характеризует и уровень мочевой кислоты в сыворотке крови. У наблюдаемых пациентов уровень мочевой кислоты соответствовал норме (214-458 мкмоль/л) и составлял 341,2-342,2 мкмоль/л. Однако в динамике наблюдения (уже на 6 сутки терапии ремаксолом) отмечался небольшой его рост (в пределах значений нормы) - до 374,4

мкмоль/л, то есть в 1,1 раза. Частота повышенных значений мочевой кислоты у больных этой группе возросла и в 2,5 раза (с 5 до 12,5%). Подобного факта у больных, получавших плацебо+базовую терапию, нами выявлено не было. Эти изменения можно связать с процессами окисления пуриновых азотистых оснований на микросомах (цитохром P450, НАДФ-зависимые дегидрогиназы), с активацией ферментов дыхательной цепи и увеличением синтеза и потребления макроэргов (прежде всего АТФ), одним из конечных продуктов метаболизма которых является мочевая кислота. Таким образом, транзиторная гиперурикемия отражает антигипоксическое действие в печени применяемого сукцинатсодержащего раствора, поскольку образование мочевой кислоты из гипоксантина под действием ксантиноксидазы (как конечного продукта распада пуринов) возможно только в гепато- и энтероцитах и не происходит в других клеточных структурах [1].

Уровень глюкозы у больных соответствовал значениям нормы и не превышал 5,5 ммоль/л, но частота гиперглюкоземии выявлялась в 10,6-8,9% случаев. Повышенный уровень глюкозы в крови указывает на то, что в организме не происходит перехода глюкозы в гликоген и аминокислоты. На протяжении всего исследования средние показатели глюкозы оставались стабильными, тем не менее, снижение частоты гиперглюкоземии у больных получавших ремаксол в 1,6 раза (с 10,6% до 6,8%) указывает на то, что ремаксол способствует переводу глюкозы в другие соединения – гликоген, аминокислоты, липиды. У пациентов контрольной группы такой динамики не установлено.

Заключение. Таким образом, включение препарата ремаксол в терапию больных ХГ В и С в стадии обострения/активации процесса улучшает общее состояние больных, снижая в 1,7 раза частоту регистрации клинических симптомов заболевания, чем у пациентов, получавших плацебо на фоне базовой терапии. Ремаксол активно снижал уровень общего билирубина и его фракций, в сравнении с плацебо+базовой терапией (отмечалась лишь тенденция к снижению показателей без существенной их динамики).

Установлен выраженный гепатопротекторный эффект ремаксол у больных хроническим гепатитом В и С с цитолитической активностью –снижение показателей АлАТ и АсАТ, кратность снижения ферментов у больных, получавших ремаксол существенно выше, чем при применении базовой терапии+плацебо.

Антиоксидантное действие препарата, проявляется активацией ферментов дыхательной цепи на фоне увеличения синтеза и потребления макроэргов (АТФ). Об этом говорит быстрая нормализация ЛДГ и транзиторная гиперурикемия, обеспечивая переключение анаэробных процессов на аэробные и улучшая энергетическое обеспечение гепатоцитов.

Выявлен антихолестатический эффект ремаксол по уровню и кратности снижения секреторных ферментов - γ -ГГТП и ЩФ в сравнении с пациентами контрольной группой. Таким образом, ремаксол является высокоэффективным гепатопротектором, улучшающим функциональную активность клеток печени и его включение в патогенетическую терапию хронических поражений печени аргументировано при проведении многоцентрового клинического исследования.

Список литературы

1. Зайчик. А.Ш., Чурилов Л.П. Основы патохимии. – СПб.,–2000. – С. 178-185.
2. Зарубина И. В., Шабанов П. Д. Молекулярная фармакология антигипоксантов., Н-Л,- 2004.-С.17-85.
3. Ивашкин В. Т. Болезни печени и желчевыводящих путей // Руководство для врачей. – 2-е издание. – М.: «М-Вести», 2005. – 536 с.
4. Коваленко А.Л. Фармакологическая активность оригинальных лекарственных препаратов на основе 1-дезоксиглюцитозила: Автореф. дис. ... д-ра биол. наук.- СПб., 2005.
5. Кожока Т.Г. Лекарственные средства в фармакотерапии патологии клетки.- М.,-2007.- 136с.
6. Костюченко А.Л., Семиголовский Н.Ю.Современные реальности клинического применения антигипоксантов // ФАРМиндекс практик.- 2002.- №3.- С.102-122.
7. Лукьянова Л.Д. Молекулярные механизмы гипоксии и современные подходы фармакологической коррекции гипоксических нарушений // Фармакотерапия гипоксии и ее последствий при критических состояниях. – СПб., 2004. – С.36-37.
8. Онищенко Г. Г. Распространение вирусных гепатитов как угроза национальной безопасности // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. – 2003. - № 4. – С. 93-99.
9. Радченко В.Г., Шабров А.В., Зиновьева Е.Н. Основы клинической гепатологии-СПб., 2005., С.306-318.
10. Рахманова А. Г., Яковлев А. А., Виноградова Е. Н., Борисов А. Е., Кашенко В. А. Хронические вирусные гепатиты и цирроз печени // СПб.: «Спецлит», 2006. – 413с.

Резюме.

В статье представлены результаты многоцентровых рандомизированных клинических исследований, оценки эффективности инфузионного раствора ремаксол, как гепатопротективного средства, при хронических поражениях печени, проведенных на 7 клинических базах. Под наблюдением находилось 494 больных, страдающих хроническим гепатитом В и С. Ремаксол получали 294 человека, активное -плацебо -200 человек. Рандомизация осуществлялась методом «конвертов». Подробно в статье описана клинико-лабораторная характеристика проявлений заболевания. Представлено влияние препарата, в сравнении с активным плацебо, на функциональную активность печени больных с хроническим ее поражением. Описан, на основании полученных лабораторных и клинических данных, механизм действия препарата, включающий гепатопротекторную активность, антиоксидантный эффект и антихолестатическое действие.

Ключевые слова: гепатит, ремаксол, цитолиз, холестаза, активное плацебо, холестерин, щелочная фосфатаза, билирубин.

Сологуб Т.В.

Горячева Л.Г.

Суханов Д.С.

Романцов М.Г.

Антонова Т.В.

Яковлев А.А.

Радченко В.Г.

Шульдяков А.А.

Речник В.Н.

Суздальцев А.А.

Есауленко Е.В.

Максимов С.Л.

Баранова И.П.